

Nekaj podatkov o smrtnosti prašičkov

- 95% poginov v prašičereji se zgodi pred odstavitvijo (1).
- 90% smrti se zgodi v prvem tednu starosti (2).
- 80 % smrtnosti je v prvih dnevih po skotitvi (3).
- Tveganje za pogin pred odstavitvijo je najvišje pri prašičkih z nizko porodno težo (< 1 kg).



Z Energynom pujski z veseljem rastejo in prispevajo k večjemu donosu rejca.

Razlogi za perinatalno smrtnost pujskov



Doziranje: 1 stisk (2 ml Energyna) / pujska / dan, dva dni



Kaj je Energygn?

Energygn je visokoenergetski gel, ki vsebuje maščobnih kisline. Energygn pomaga slabotnim in manjšim prašičkom povečati možnost za preživetje. Večji delež predstavljajo srednjeveržne maščobne kisline (85%), ki so hitroprebavljive in jih pujski lahko absorbirajo hitro po rojstvu.

Hiter vir energije.

Odlična palatibilnost - ješčost.

Enostavno doziranje, ker je v obliki gela in zaradi oblikovanja stekleničke. Oranžna barva omogoča, da ločimo prašičke, ki so dobili Energygn in da enostavno ugotovimo iz katerih seskov so sesali.

Pred uporabo ni potrebno pretresti.

Zakaj Energygn?

- pri življenju ohranimo živali z visoko genetsko vrednostjo (na kmetijah s plemenskimi živalmi)
- več odstavljenih pujskov / svinjo / leto = večji profit farme
- ker majhni prašički ne kažejo razlik pri uspešnosti pitanja v primerjavi z večjimi pujski
- dokazano je tudi, da ni razlik v kvaliteti trupa in v organoleptičnih lastnostih med pujski, ki so bili ob skotitvi manjši in tistimi, ki so imeli višjo porodno težo

Rezultati poskusov z Energygnom

Poskus 1:

Skupno št. novorojenih pujskov	Število pujskov z nizko porodno težo	Doza Energygna: en stisk	Stopnja preživetja po 12 urah	Št. umrlih pujskov
120	15	2 ml	93%	1

Poskus 2: Primerjava treh različnih vzorcev dajanja Energygna. Po 24 urah so bili pujski z nižjo težo grupirani in premeščeni k dojilji.

	1. dan	2. dan	3. dan	4. dan	5. dan
En stisk Energygna takoj po rojstvu					
Stopnja preživetja	80%	80%	73%	66%	66%
En stisk Energygna takoj po rojstvu, ponovitev čez 12 ur					
Stopnja preživetja	83%	83%	83%	83%	83%
En stisk Energygna takoj po rojstvu, ponovitev čez 24 ur					
Stopnja preživetja	95%	95%	95%	95%	95%

Poskus 3: Primerjava treh različnih vzorcev dajanja Energygna. Po 24 urah so bili pujski z nižjo težo grupirani in premeščeni k dojilji.

	Družinska kmetija		Velika farma	
	Skupina, ki je dobivala Energygn	Kontrolna skupina	Skupina, ki je dobivala Energygn	Kontrolna skupina
Stopnja preživetja	82%	77%	66%	54%

V obeh primerih so manjše pujske (750 g – 1000 g) pustili v originalnem leglu. Na družinski kmetiji se je stopnja preživetja povečala za 5%, na veliki industrijski farmi pa za 12 %.